



# СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИЯ

Название препарата	Применение препарата	
	Если колоноскопия назначена на первую половину дня, до 12:00	Если колоноскопия назначена на вторую половину дня, с 12:00 включительно:
<b>Пикопреп</b>	<p>Режим единовременного применения</p> <p>Накануне дня исследования или операции (последний прием пищи в 14:00):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18:00-18:30 – 1 пакетик пикопрепа растворить в одном стакане воды и выпить</li><li>• 18:30-20:00 - выпить 1, 5 литра прозрачной жидкости (вода, чай)</li><li>• 20:00-20:30 – 1 пакетик пикопрепа растворить в одном стакане воды и выпить</li><li>• 20:30- 22:00- выпить 1,5 литра прозрачной жидкости (вода, чай)</li></ul> <p>В день исследования не пить, не есть!!! Исключение: прием гипотензивных, антиаритмических препаратов (в 6:00 с несколькими глотками воды).</p>	<p>Режим двухэтапного применения</p> <p>Вечером, накануне дня исследования или операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18:00-18 :30– 1 пакетик пикопрепа растворить в одном стакане воды и выпить</li><li>• 18:30-20:00 - выпить 1, 5 литра прозрачной жидкости (вода, чай)</li></ul> <p>Утром, в день процедуры или операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 05:00-05:30 – 1 пакетик пикопрепа растворить в одном стакане воды и выпить</li><li>• 05:30- 07:00 - выпить 1,5 литра прозрачной жидкости (вода, чай)</li></ul> <p>Прием гипотензивных и антиаритмических препаратов разрешен в конце подготовки. После 7:00 не пить!!!</p>
<b>Эзиклен</b>	<p>Режим единовременного применения</p> <p>Накануне дня исследования или операции (последний прием пищи в 14:00):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18:00-19:00 - Содержимое одного флакона препарата «Эзиклен» следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). Выпить в течение одного часа, не одномоментно!!!</li><li>• 19:00-20:00 - выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)</li><li>• 20:00-21:00 – Содержимое второго флакона «Эзиклен» также вылить в мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л).</li></ul> <p>Выпить в течение одного часа, не одномоментно!!!</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 21:00- 22:00 - выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)</li></ul> <p>В день исследования не пить, не есть!!! Исключение: прием гипотензивных, антиаритмических препаратов (в 6:00 с несколькими глотками воды).</p>	<p>Накануне дня исследования или операции (последний прием пищи в 14:00):</p> <p>Режим двухэтапного применения</p> <p>Вечером, накануне дня исследования или операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 19:00-20:00 - Содержимое одного флакона препарата «Эзиклен» следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л).</li><li>• 20:00-21:00 - выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)</li></ul> <p>Утром, в день исследования или операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 05:00-06:00 -Содержимое одного флакона препарата «Эзиклен» следует вылить в прилагаемый мерный стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л).</li><li>• 06:00-07:00 - выпить литр прозрачной жидкости (вода, чай) (два мерных стакана)</li></ul> <p>Допустим прием гипотензивных и антиаритмических препаратов. После 7:00 не пить!!! Есть в день исследования нельзя!!</p>



8 (495) 266 03 03 • 103@medmente.ru



www.medmente.ru



# СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИЯ

Название препарата	Применение препарата	
	Если колоноскопия назначена на первую половину дня, до 12:00	Если колоноскопия назначена на вторую половину дня, с 12:00 включительно:
<b>Мовипреп</b>	<p>Режим одновременного применения</p> <p>Накануне дня исследования или операции (последний прием пищи в 14:00):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18:00-19:00 - содержимое одного саше А и одного саше Б полностью растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по стакану в 15 минут</li><li>• 19:00-20:00 - выпить 1 литр прозрачной жидкости (вода, чай)</li><li>• 20:00-21:00 – содержимое второго саше А и второго саше Б полностью растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по стакану в 15 минут</li><li>• 21:00- 21:30- выпить 1 литр прозрачной жидкости (вода, чай)</li></ul> <p>В день исследования не пить, не есть!!! Исключение: прием гипотензивных, антиаритмических препаратов (в 6.00 с несколькими глотками воды)</p>	<p>Режим двухэтапного применения</p> <p>Вечером, накануне дня исследования или операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 18:00-19:00 - содержимое одного саше А и одного саше Б полностью растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по стакану в 15 минут</li><li>• 19:00-20:00 - выпить 1 литр прозрачной жидкости (вода, чай)</li></ul> <p>Утром, в день процедуры или операции:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 05:30-06:30 – содержимое второго саше А и второго саше Б полностью растворить в 1 литре питьевой негазированной воды комнатной температуры, выпить в течение часа по стакану в 15 минут</li><li>• 06:30- 07:00 - выпить 1 литр прозрачной жидкости (вода, чай)</li></ul> <p>Прием гипотензивных и антиаритмических препаратов разрешен в конце подготовки. После 7:00 не пить!!!</p>

8 (495) 266 03 03 • 103@medmente.ru



[www.medmente.ru](http://www.medmente.ru)